

CHOROBY ZAWODOWE W 2013 r.

W roku 2013 stwierdzono 49 przypadków chorób zawodowych (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.). Ponadto wydano 25 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Wykres: Liczba chorób zawodowych stwierdzonych w woj. lubuskim w latach 1999-2013.





Tabela: Choroby zawodowe stwierdzone w województwie lubuskim w latach 2010-2013.

Pozycja wykazu	Wykaz chorób zawodowych	Liczba stwierdzonych chorób			
		2010	2011	2012	2013
3	Pylice płuc	-	-	3	1
6	Astma oskrzelowa	3	1	1	1
7	Zewnątrzpoходne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych	1	2	-	-
12	Alergiczny nieżyt nosa	3	1	-	2
15	Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat	10	3	5	5
17	Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi	-	1	-	1
18	Choroby skóry	2	1	6	3
19	Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy	2	3	2	4
20	Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy	3	5	5	7
21	Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz	3	2	9	3
22	Zespół wibracyjny	-	4	1	1
26	Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:	23	27	41	21
	1. wirusowe zapalenie wątroby typu B	-	1	1	1
	2. wirusowe zapalenie wątroby typu C	2	2	1	1
	3. borelioza	20	20	39	18
	4. brucelloza	-	2	-	-
	5. inne (w tym gruźlica)	1	2	-	1
ogółem		50	50	74	49

Wykres: Liczba chorób zawodowych stwierdzonych w poszczególnych powiatach woj. lubuskim w 2013 r.



Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w porównaniu do 2012 r. spadła o 25 przypadków. Największy spadek odnotowano w chorobach zakaźnych (z 41 do 21), wśród których odnotowano o 21 mniej przypadków boreliozy. Jest to od kilku lat najczęściej stwierdzana choroba zawodowa w województwie, w którym niemal połowę obszaru stanowią tereny zalesione. Najwięcej przypadków – 13 stwierdzono u leśników, 3 dotyczyły rolników. Pozostałe 2 przypadki boreliozy zostały rozpoznane u pracownika zajmującego się obróbką drewna oraz pielęgnującego zieleń na terenie miasta. Nadal znaczna liczba przypadków boreliozy zarejestrowana jest jako „podejrzenie” i oczekuje na ustalenie ostatecznego rozpoznania klinicznego. W porównaniu do 2012 r. nie odnotowano wzrostu zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (rozpoznano po 1 przypadku u sanitariusza i pielęgniarki). Stwierdzono 1 przypadek gruźlicy u pielęgniarki zatrudnionej w NZOZ.

Choroby alergiczne w populacji ogólnej występują z dużą częstotliwością, jednak w porównaniu do roku 2012 w woj. lubuskim nie odnotowano wzrostu zachorowań mających etiologię zawodową pomimo narażenia na licznie występujące czynniki alergizujące i drażniące w środowisku pracy.






W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek liczby chorób zawodowych spowodowanych czynnikami środowiska pracy, które podlegają obowiązkowi badań lub pomiarów (m.in. hałas, drgania, zapylenie). W roku 2013 stwierdzono 3 przypadki zawodowego uszkodzenia słuchu (w 2012 r. - 9 przypadków) oraz po 1 przypadku pylicy krzemowej płuc i zespołu wibracyjnego. W Polsce od wielu lat funkcjonują przepisy prawne obligujące pracodawców do podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zawodowego.

W 2013 r. stwierdzono 1 nowotwór pęcherza moczowego (u mechanika samochodowego – diagnosty) jako następstwo działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi (węglowodory aromatyczne wchodzące w skład spalin samochodowych). W trzech przypadkach nie potwierdzono zawodowej etiologii nowotworów złośliwych (dotyczy zgłoszonych 2 przypadków podejrzenia nowotworu płuca i 1 podejrzenia nowotworu pęcherza moczowego).

Przewlekłe choroby układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy nadal stanowią częstą przyczynę niezdolności do pracy, co jednoznacznie wskazuje na potrzebę opracowania i wdrażania programów profilaktycznych. W 2013 r. stwierdzono wzrost o 2 przypadki chorób w tych grupach. Wśród chorób obwodowego układu nerwowego najczęściej rozpoznawanym schorzeniem był zespół cieśni nadgarstka (7 przypadków).



Odnotowano 5 przypadków chorób zawodowych związanych z działalnością rolniczą. Stwierdzono u rolników indywidualnych 3 przypadki boreliozy, 1 - alergicznego nieżytu nosa (narażenie na alergen pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i chemicznego) oraz 1 przypadek zespołu cieśni w obrębie nadgarstków (ręczne dojenie krów).

Należy zauważyć, że zdaniem specjalistów patologii zawodowej dane uzyskane na podstawie rejestrów chorób zawodowych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację epidemiologiczną. Niedoszacowanie może wynikać z niskiej świadomości biologicznych skutków narażenia zawodowego, zwłaszcza występujących po wielu latach od ustania zatrudnienia.